


## Ausies trauma

Išorinė klausomoji landa ar ausies kaušelis gali būti sužeisti krapštant ausį arba traumuojuant nelaimingų atsitikimų ir avarijų metu. Tokių traumų metu atsiranda ausies nubrozdinimai, sumušimai, mėlynės ir didesnės poodinės hematomos. Boksininkams, imtynininkams dėl dažno ausies kaušelio deformavimo pakinta jo forma ir tokia ausis vadinama boksininko arba kalafioro ausis. Susidariusias hematomas reikia punktuoti arba atverti, jas drenuoti, pažeidimo vietoje uždėti spaudžiamą tvarstį, paskirti antibiotikus dėl galimo hematomos supūliavimo. Jei yra išorinės klausomosios landos pažeidimas, landą tikslinga sutepti antibiotikų tepalu (**Ung. Baneocin**).



### Terminiai ausies pažeidimai

Pabuvus ilgesnį laiką šaltame ore ir neapsaugojus ausų nuo šalčio, galimas ausies kaušelio nušalimas. Taip pat ilgesnį laiką veikiant karščiui ar saulės spinduliams galimas ausies kaušelio nudegimas. Iš pradžių jaučiamas ausies kaušelio nutirpimas, vėliau atšilus kaušelis patinsta, būna skausmingas, parausta. Taip pat gali atsirasti didesnių ar mažesnių skausmingų pūslelių. Esant pirmo laipsnio nušalimui ar nudegimui pažeidžiamas tik paviršinis epitelis. Esant antro laipsnio pažeidimui atsiranda skausmingų pūslelių. Trečio laipsnio pakenkimo atveju pažeidžiami visi odos sluoksniai, atsiranda odos nekrozės židinių.